



Hydrolyse du saccharose

Baccalauréat de septembre 2022 – exercice 1 du sujet de métropole


■ Physique-Chimie : cinétique d'une réaction chimique

- Établir la loi d'évolution de la concentration d'une espèce en fonction du temps pour une réaction d'ordre 0 ou d'ordre 1.
- Déterminer l'ordre d'une réaction et la constante de vitesse en exploitant des données issues d'un suivi cinétique.
- Déterminer le temps de demi-réaction.

■ Mathématiques : fonction exponentielle de base e ; fonction logarithme népérien

- Utiliser les propriétés algébriques de l'exponentielle pour transformer des expressions.
- Étudier les variations de fonctions somme, produit ou quotient de fonctions exponentielles (du type $x \mapsto e^{kx}$ pour k réel) et de fonctions polynômes.
- Déterminer les limites en $-\infty$ et en $+\infty$ de fonctions somme, produit ou quotient de fonctions exponentielles et de fonctions polynômes.
- Utiliser les propriétés algébriques de la fonction logarithme népérien pour transformer des expressions.


Le saccharose, de formule brute $C_{12}H_{22}O_{11}$, est l'unique composant du sucre de table, quelle que soit sa forme (cristallisé, semoule, en grains, en morceaux, ...). Issu principalement de la culture de la betterave sucrière et de la canne à sucre, on le retrouve dans de nombreux produits sucrés.



Représentation de Cram de la molécule de saccharose

Source : Pixabay

Lors de son ingestion, le saccharose est hydrolysé par les sucs gastriques et libère, en quantités équimolaires, du fructose et du glucose, deux isomères de formule brute $C_6H_{12}O_6$. L'hydrolyse du saccharose en solution aqueuse peut être modélisée par la réaction d'équation suivante :



En présence d'un acide, l'hydrolyse se produit partiellement, voire totalement, au cours du temps. Cette transformation chimique du saccharose est extrêmement lente.

Les boissons de type soda ont pour conservateurs les plus courants l'acide citrique et l'acide phosphorique. Plus la boisson est acide, plus l'hydrolyse du saccharose qu'elle contient est rapide.

On considère une canette de soda de 330 mL contenant 35 g de saccharose dont on étudie la transformation par hydrolyse au cours du temps.

Donnée : masse molaire du saccharose $M = 342 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.



1. Calculer la quantité de matière de saccharose contenue dans le volume de soda de la canette et en déduire que sa concentration initiale en quantité de matière de saccharose, notée $[A]_0$, est environ égale à $0,3 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Au cours de l'étude expérimentale de la transformation au cours du temps du saccharose, deux représentations de l'évolution de sa concentration, notée $[A]$, en fonction du temps ont pu être tracées. Elles sont données dans le **document réponse DR1 page 11 à rendre avec la copie**.

2. Compléter chacune des deux représentations sur le **document réponse DR1 page 11, à rendre avec la copie**, en utilisant la valeur de la concentration initiale en saccharose $[A]_0$ obtenue à la question précédente.

L'évolution de la concentration d'une espèce E en fonction du temps peut notamment être donnée par l'une des relations suivantes selon la loi de vitesse de la transformation chimique étudiée :

$$\text{Réaction d'ordre 0 : } [E] = [E]_0 - kt \quad (\text{relation 1})$$

$$\text{Réaction d'ordre 1 : } \ln[E] = \ln[E]_0 - kt \quad (\text{relation 2})$$

où k est la constante de vitesse de la transformation chimique étudiée et $[E]_0$ la concentration initiale de l'espèce E.

3. Expliquer pourquoi les résultats expérimentaux tranchent en faveur d'une loi de vitesse d'ordre 1, plutôt que d'ordre 0, pour l'hydrolyse du saccharose.
4. Déterminer graphiquement la valeur de la constante de vitesse k de cette réaction. Indiquer, sur la courbe choisie, les points utilisés pour le calcul en complétant le **document réponse DR1 page 11, à rendre avec la copie**.

Par la suite, on note f la fonction définie sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ modélisant, en fonction du temps t , exprimé en seconde la concentration de saccharose $f(t)$, exprimée $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Pour une évolution de la concentration donnée par une relation d'ordre 1, les données physiques de l'expérience conduisent à résoudre l'équation différentielle (E) :

$$y' = -6 \cdot 10^{-7}y$$



5. Déterminer la fonction f solution de l'équation différentielle (E) telle que $f(0) = 0,3$.

Par la suite, la fonction f est définie sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ par $f(t) = 0,3e^{-6 \cdot 10^{-7}t}$.

6. Calculer la concentration en quantité de matière de saccharose dans la canette soda au bout de 60 jours. Commenter le résultat.



Document réponse DR1 page 11 à rendre avec la copie



Les valeurs de $\ln[A]$ ont été calculées avec la concentration $[A]$ exprimée en mol.L^{-1} .

Source : d'après <https://www.concours-agro-veto.net>